



United States Department of Agriculture

家禽圍場清潔及消毒檢查表

保持禽舍、雞舍和其他圍場清潔是防止細菌在家禽群中傳播的最佳方法之一。徹底清潔，然後施用消毒劑，這需要時間。但這個過程對於阻止疾病傳播和保持我們的家禽群的健康至關重要。

如果您發現或懷疑有任何異常，請立即致電您的禽群主管、獸醫或合作推廣辦事處 (cooperative extension office)。請使用此表單記錄您所在地區的聯絡人電話號碼。您行動越早，就越容易將疾病控制在一個禽群中。



檢查背面的清單，瞭解有助於保持您禽群健康的提示。



報告病禽

如果您看到疾病跡象，請立即採取行動！

電話號碼

獸醫

合作推廣辦事處

州獸醫/動物或家禽診斷實驗室

USDA

866.536.7593



動物與植物健康檢驗服務 (Animal and Plant Health Inspection Service)



✓ 檢查表：幫助您保持禽群健康的提示

該檢查表是實施良好生物安全的一般指引，但如果您有特定場址的生物安全計劃，則請遵循該計劃。商業養殖者應確保其特定場址計劃遵循《國家禽類改良計劃》(National Poultry Improvement Plan)的生物安全原則。

- 穿戴個人防護設備**或穿戴您只在料理家禽時所使用的衣服和鞋子。這包括可以消毒的靴套或靴子。在禽舍或雞舍之間換上新的防護裝備。
- 為進行徹底清潔，必須空出圍場。**如果您有一個禽舍，請等到該禽舍空了以後再開始清潔程序。如果您有雞舍或其它類型的圍場，請在清潔前將禽類移到另一單獨的區域。
- 清除所有垃圾、糞便和其它雜物。**
- “幹式”清潔所有區域**——刷掉、刮去和鏟除糞便、羽毛及其它物料。消毒劑不會滲透進有機物或結塊污垢。
- “濕式”清潔所有表面**——用水和清潔劑擦洗。從上到下、從後到前進行清潔。
- 用水仔細沖洗所有表面。**
- 請根據標籤上的指示施用消毒劑。**務必使用美國環境保護署(簡稱EPA)注册的消毒劑，這表明它對禽流感和其它家禽疾病有效。
- 保持圍場清空**直至完全乾燥。使用風扇和/或打開門窗來幫助加快乾燥過程。潮濕的表面可能對家禽有害。
- 完成工作後，取下並丟棄**您的防護裝備。如果使用專用的衣服和靴子，請更換衣物並對您的靴子進行清潔和消毒。
- 用肥皂和水徹底洗淨雙手。**清洗並乾燥專用的衣物。

如需瞭解更多關於如何保持禽群健康的資訊，請關注 **Facebook** 和 **Twitter** 上的“保護禽群”(Defend the Flock)，並訪問 www.aphis.usda.gov/animalhealth/defendtheflock。

