

Summary of Studies Supporting USDA Product Licensure

Nom d'établissement	Zoetis Inc.
Permis d'établissement de produits biologiques vétérinaires de l'USDA	190
Code de produit	9580.03
Nom attribué	Immunothérapie pour la dermatite allergique canine
Nom commercial / Distributeur (si différent du fabricant)	Cytopoint – Aucun distributeur particulier
Date du Sommaire d'études	Le 4 octobre 2021

Avertissement : Ne pas utiliser les études qui suivent pour comparer un produit à un autre. Des légères différences dans la conception et l'exécution d'une étude peuvent rendre la comparaison dénuée de sens.

Type d'étude	Efficacité																																																					
Étude portant sur	Prurit associé à la dermatite allergique																																																					
Objectif de l'étude	Démontrer l'efficacité contre le prurit associé à la dermatite allergique																																																					
Administration du produit	Une seule dose administrée par voie sous-cutanée																																																					
Animaux expérimentaux	Quarante beagles de laboratoire, âgés d'environ 17 à 19 mois Groupes de traitement : - Groupe témoin négatif – 20 chiens - Groupe traité par le produit à l'étude – 20 chiens																																																					
Description de la provocation	IL-31 canine recombinée purifiée administrée aux jours de l'étude -7, 1 et 28																																																					
Intervalle observé après la provocation	Aux jours -7, 1 et 28, les chiens ont été surveillés pendant 2 heures après chaque provocation pour détecter des signes de prurit.																																																					
Résultats	Le nombre de minutes (0-120) durant la période d'observation de 2 heures après la provocation pendant lesquelles un comportement dénotant la présence de prurit a été noté et a été désigné comme score de prurit. Les chiens qui présentaient des comportements comme se lécher, se mordiller, se gratter ou se frotter n'importe quelle partie du corps ou encore se secouer la tête ou le corps étaient considérés comme démontrant des comportements associés au prurit. Les scores de prurit ont été notés pour chaque animal après la provocation par l'IL-31 aux jours -7, 1 et 28. Tableau 1. Résumé en cinq chiffres des scores de prurit, par groupe de traitement et jour de provocation par l'IL-31. <table><tr><th>Jour de l'étude</th><th>Groupe</th><th>n</th><th>Minimum</th><th>25^e percentile</th><th>Médiane</th><th>75^e percentile</th><th>Maximum</th></tr><tr><td rowspan="2">-7</td><td>Témoin négatif</td><td>20</td><td>46</td><td>75</td><td>94</td><td>106</td><td>120</td></tr><tr><td>Produit à l'étude</td><td>20</td><td>40</td><td>78</td><td>91</td><td>102</td><td>117</td></tr><tr><td rowspan="2">1</td><td>Témoin négatif</td><td>20</td><td>55</td><td>100</td><td>105</td><td>116</td><td>120</td></tr><tr><td>Produit à l'étude</td><td>20</td><td>1</td><td>7</td><td>10</td><td>13</td><td>35</td></tr><tr><td rowspan="2">28</td><td>Témoin négatif</td><td>20</td><td>48</td><td>68</td><td>98</td><td>106</td><td>119</td></tr><tr><td>Produit à l'étude</td><td>20</td><td>5</td><td>8</td><td>10</td><td>18</td><td>117</td></tr></table> n = nombre d'animaux Les données brutes sont présentées ci-après.	Jour de l'étude	Groupe	n	Minimum	25 ^e percentile	Médiane	75 ^e percentile	Maximum	-7	Témoin négatif	20	46	75	94	106	120	Produit à l'étude	20	40	78	91	102	117	1	Témoin négatif	20	55	100	105	116	120	Produit à l'étude	20	1	7	10	13	35	28	Témoin négatif	20	48	68	98	106	119	Produit à l'étude	20	5	8	10	18	117
Jour de l'étude	Groupe	n	Minimum	25 ^e percentile	Médiane	75 ^e percentile	Maximum																																															
-7	Témoin négatif	20	46	75	94	106	120																																															
	Produit à l'étude	20	40	78	91	102	117																																															
1	Témoin négatif	20	55	100	105	116	120																																															
	Produit à l'étude	20	1	7	10	13	35																																															
28	Témoin négatif	20	48	68	98	106	119																																															
	Produit à l'étude	20	5	8	10	18	117																																															
Date d'approbation par l'USDA	Le 6 juin 2018																																																					

		Score de prurit (nombre de minutes de comportement associé au prurit)		
Groupe	Animal	Jour -7 (référence)	Jour 1	Jour 28
Témoin négatif	3148743	96	92	70
Témoin négatif	3150624	82	107	67
Témoin négatif	3156568	87	110	98
Témoin négatif	3165231	46	69	67
Témoin négatif	3172563	111	116	115
Témoin négatif	3179282	114	119	116
Témoin négatif	3180256	101	113	105
Témoin négatif	3185631	79	103	102
Témoin négatif	3188184	98	98	68
Témoin négatif	3192637	106	101	110
Témoin négatif	3195326	77	101	104
Témoin négatif	3195709	111	117	102
Témoin négatif	3205925	47	55	62
Témoin négatif	3207618	120	118	119
Témoin négatif	3211747	61	67	48
Témoin négatif	3212000	68	100	73
Témoin négatif	3212166	69	103	98
Témoin négatif	3212336	100	117	57
Témoin négatif	3212492	108	115	115
Témoin négatif	3213626	92	120	95
Produit à l'étude	3148735	86	7	10
Produit à l'étude	3153852	50	1	7
Produit à l'étude	3160972	100	24	6
Produit à l'étude	3162291	48	5	10
Produit à l'étude	3188648	87	28	32
Produit à l'étude	3191827	102	2	117
Produit à l'étude	3195679	67	12	9
Produit à l'étude	3198198	104	11	15
Produit à l'étude	3202110	110	20	5
Produit à l'étude	3203612	115	10	17
Produit à l'étude	3204767	115	13	10
Produit à l'étude	3206158	40	10	5

		Score de prurit (nombre de minutes de comportement associé au prurit)		
Groupe	Animal	Jour -7 (référence)	Jour 1	Jour 28
Produit à l'étude	3207090	40	10	8
Produit à l'étude	3207936	95	7	23
Produit à l'étude	3208843	82	13	16
Produit à l'étude	3216358	117	35	29
Produit à l'étude	3216668	83	6	8
Produit à l'étude	3217249	101	10	27
Produit à l'étude	3218831	96	9	5
Produit à l'étude	6534571	84	4	11

Les provocations par l'IL-31 ont eu lieu aux jours de l'étude -7, 1 et 28. Le prurit a été évalué pour tous les animaux au jour -7 après la provocation par l'IL-31, ainsi qu'aux jours 1 et 28 après l'administration du produit au jour 0.

Type d'étude	Efficacité																					
Étude portant sur	TOUS																					
Objectif de l'étude	Démontrer l'efficacité contre les signes cliniques associés à la dermatite atopique canine																					
Administration du produit	Dose unique du produit à l'étude ou d'un placebo administrée par voie sous-cutanée																					
Animaux expérimentaux	Chiens appartenant à des clients d'établissements vétérinaires, âgés de 1,5 à 12 ans et pesant de 2,2 à 76,5 kg, ayant des antécédents documentés de dermatite atopique non saisonnière depuis au moins 1 an, des démangeaisons jugées au moins « légères » selon leurs propriétaires et un score total d'au moins 30 à l'échelle CADESI-03 (<i>Canine Atopic Dermatitis Extent and Severity Index</i>) selon les médecins vétérinaires. Les chiens (ayant reçu un diagnostic de dermatite atopique) recrutés dans 14 établissements vétérinaires ont été répartis dans les groupes de traitement suivants : 50 chiens – Placebo (groupe témoin) 47 chiens – Produit à l'étude (2,0 mg/kg)																					
Description de la provocation	Ne s'applique pas																					
Intervalle observé après la provocation	Les chiens ont été évalués pour déceler des signes cliniques de dermatite atopique pendant une période de 56 jours après l'administration du produit à l'étude ou du placebo. Les médecins vétérinaires évaluaient la peau des chiens au moyen de l'échelle CADESI-03 toutes les semaines pendant les deux premières semaines, et toutes les deux semaines par la suite (jours 0, 7, 14, 28, 42 et 56).																					
Résultats	L'échelle d'évaluation de la peau CADESI-03 repose sur quatre signes cliniques : l'érythème (rougeur), l'alopécie (perte de poils), l'excoriation (lésions cutanées) et la lichénification (épaississement de la peau). Ces signes cliniques ont été évalués sur 62 sites du corps et une note de 0 à 5 leur a été attribuée selon leur gravité. Tableau 1. Chiens retirés de l'étude <table><tr><th></th><th colspan="2">Nombre de retraits cumulatifs/nombre d'évaluations de l'efficacité</th></tr><tr><th>Jour de l'étude</th><th>Placebo</th><th>Produit à l'étude</th></tr><tr><td>0-7</td><td>7/50 (14 %)</td><td>0/47 (0 %)</td></tr><tr><td>8-14</td><td>12/50 (24 %)</td><td>1/47 (2,1 %)</td></tr><tr><td>15-28</td><td>21/50 (42 %)</td><td>6/47 (12,8 %)</td></tr><tr><td>29-42</td><td>25/50 (50 %)</td><td>11/47 (23,4 %)</td></tr><tr><td>43-56</td><td>26/50 (52 %)</td><td>12/47 (25,5 %)</td></tr></table> Dans le groupe témoin, 26 chiens ont été retirés avant le jour 56 de l'étude en raison de l'aggravation de leurs signes cliniques de dermatite atopique, comparativement à 11 chiens du groupe du produit à l'étude. Un chien a été retiré avant la 56^e journée de l'étude pour d'autres raisons. Le tableau 2 (placebo) et le tableau 3 (produit à l'étude) présentent, pour chaque animal, les résultats des évaluations et les scores de gravité des différents signes cliniques aux jours 0, 7, 14, 28, 42 et 56 de l'étude (fréquence maximale = 62).		Nombre de retraits cumulatifs/nombre d'évaluations de l'efficacité		Jour de l'étude	Placebo	Produit à l'étude	0-7	7/50 (14 %)	0/47 (0 %)	8-14	12/50 (24 %)	1/47 (2,1 %)	15-28	21/50 (42 %)	6/47 (12,8 %)	29-42	25/50 (50 %)	11/47 (23,4 %)	43-56	26/50 (52 %)	12/47 (25,5 %)
	Nombre de retraits cumulatifs/nombre d'évaluations de l'efficacité																					
Jour de l'étude	Placebo	Produit à l'étude																				
0-7	7/50 (14 %)	0/47 (0 %)																				
8-14	12/50 (24 %)	1/47 (2,1 %)																				
15-28	21/50 (42 %)	6/47 (12,8 %)																				
29-42	25/50 (50 %)	11/47 (23,4 %)																				
43-56	26/50 (52 %)	12/47 (25,5 %)																				
Date d'approbation par l'USDA	Le 16 mars 2015																					

Tableau 2. Résultats des évaluations de chaque animal et scores de gravité des différents signes cliniques aux jours 0, 7, 14, 28, 42 et 56 de l'étude																									
Groupe placebo																									
		Signe clinique*																							
		Alopécie						Érythème						Excoriation						Lichénification					
		0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5
Animal	Jour de l'étude																								
1003	0	52	0	6	4	0	0	38	0	15	9	0	0	62	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	7	52	0	9	1	0	0	42	0	6	14	0	0	62	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	14	54	0	7	1	0	0	40	0	12	10	0	0	62	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	28	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
	42	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
	56	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
1008	0	57	0	1	4	0	0	47	0	5	10	0	0	58	0	4	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	7	62	0	0	0	0	0	49	4	9	0	0	0	62	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	14	62	0	0	0	0	0	46	6	10	0	0	0	62	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	28	62	0	0	0	0	0	55	3	4	0	0	0	62	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	42	62	0	0	0	0	0	55	7	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	56	62	0	0	0	0	0	52	10	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
1104	0	34	4	6	18	0	0	10	0	31	21	0	0	31	0	10	21	0	0	35	0	6	21	0	0
	7	43	13	4	2	0	0	4	9	37	12	0	0	27	10	15	10	0	0	30	9	13	10	0	0
	14	39	14	6	3	0	0	2	1	45	14	0	0	37	3	17	5	0	0	37	3	20	2	0	0
	28	26	14	22	0	0	0	0	23	39	0	0	0	21	17	24	0	0	0	30	10	22	0	0	0
	42	41	21	0	0	0	0	10	25	27	0	0	0	39	22	1	0	0	0	46	16	0	0	0	0
	56	33	11	17	1	0	0	0	3	42	17	0	0	28	4	27	3	0	0	30	7	23	2	0	0
1108	0	10	28	5	18	1	0	4	0	18	35	5	0	10	22	7	20	3	0	18	16	7	18	3	0
	7	29	5	11	16	1	0	0	0	41	20	1	0	34	5	6	16	1	0	38	5	2	16	1	0
	14	22	24	3	13	0	0	8	0	25	28	1	0	22	23	3	14	0	0	36	11	0	15	0	0
	28	4	46	6	6	0	0	0	2	42	18	0	0	18	10	24	10	0	0	23	18	16	5	0	0
	42	19	18	19	6	0	0	0	0	23	38	1	0	22	12	20	8	0	0	27	12	20	3	0	0
	56	11	12	25	14	0	0	0	0	12	47	3	0	18	11	18	15	0	0	27	10	11	14	0	0
1202	0	10	38	7	6	1	0	17	19	16	7	3	0	56	4	2	0	0	0	27	13	12	6	4	0
	7	15	28	7	10	2	0	19	26	11	6	0	0	59	2	1	0	0	0	36	6	11	9	0	0
	14	24	31	2	5	0	0	17	24	11	9	1	0	50	6	4	1	1	0	38	15	5	2	2	0
	28	24	21	12	5	0	0	25	22	13	2	0	0	58	2	2	0	0	0	37	8	13	4	0	0
	42	18	31	8	4	1	0	31	22	5	4	0	0	54	6	0	2	0	0	42	7	9	3	1	0
	56	25	25	9	3	0	0	25	10	18	7	2	0	57	3	2	0	0	0	24	13	15	10	0	0
1207	0	33	21	7	1	0	0	19	23	15	3	2	0	54	7	1	0	0	0	44	7	9	2	0	0
	7	25	32	4	1	0	0	19	34	8	1	0	0	57	4	0	1	0	0	37	12	12	1	0	0
	14	39	21	2	0	0	0	19	25	14	4	0	0	59	2	1	0	0	0	44	10	6	2	0	0
	28	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA

** 0 = Aucune lésion (peau normale), 1 = lésions légères, 2 ou 3 = lésions modérées, 4 ou 5 = lésions graves, DA = retrait en raison de l'aggravation des signes cliniques de dermatite atopique, ND = non disponible*

Tableau 2. Résultats des évaluations de chaque animal et scores de gravité des différents signes cliniques aux jours 0, 7, 14, 28, 42 et 56 de l'étude																									
Groupe placebo																									
		Signe clinique*																							
		Alopécie						Érythème						Excoriation						Lichénification					
		0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5
Animal	Jour de l'étude																								
1207	42	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
	56	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
1301	0	60	0	2	0	0	0	33	15	4	4	6	0	53	6	3	0	0	0	50	3	5	4	0	0
	7	60	0	2	0	0	0	35	15	12	0	0	0	60	2	0	0	0	0	54	2	6	0	0	0
	14	61	0	1	0	0	0	32	21	7	2	0	0	60	2	0	0	0	0	56	1	5	0	0	0
	28	57	5	0	0	0	0	33	22	7	0	0	0	60	2	0	0	0	0	54	4	3	1	0	0
	42	62	0	0	0	0	0	41	15	6	0	0	0	62	0	0	0	0	0	56	1	5	0	0	0
	56	59	3	0	0	0	0	46	10	4	2	0	0	62	0	0	0	0	0	56	1	5	0	0	0
1308	0	42	9	10	1	0	0	11	6	27	16	2	0	50	9	3	0	0	0	46	10	6	0	0	0
	7	48	7	7	0	0	0	28	12	15	7	0	0	56	6	0	0	0	0	49	9	3	1	0	0
	14	42	10	7	3	0	0	24	13	13	9	3	0	54	5	0	3	0	0	47	8	6	1	0	0
	28	44	11	5	2	0	0	26	19	9	6	2	0	56	4	1	1	0	0	52	5	4	1	0	0
	42	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
	56	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
1311	0	35	10	9	1	2	5	10	19	13	16	4	0	56	3	1	2	0	0	40	10	9	2	0	1
	7	39	9	8	3	2	1	6	23	17	13	3	0	56	4	1	1	0	0	33	18	6	4	1	0
	14	34	8	12	5	2	1	24	14	13	11	0	0	53	8	1	0	0	0	34	20	4	3	0	1
	28	36	10	7	6	2	1	20	14	14	11	3	0	59	3	0	0	0	0	34	19	6	2	1	0
	42	44	9	3	1	1	4	20	8	16	15	3	0	48	8	5	1	0	0	33	15	8	5	1	0
	56	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
1315	0	53	3	2	3	1	0	17	23	12	9	1	0	60	2	0	0	0	0	51	6	4	1	0	0
	7	54	3	2	3	0	0	18	23	16	5	0	0	59	3	0	0	0	0	49	9	4	0	0	0
	14	57	0	2	3	0	0	10	29	15	8	0	0	60	1	0	1	0	0	52	8	1	1	0	0
	28	50	4	6	2	0	0	13	16	26	7	0	0	59	1	2	0	0	0	53	4	2	3	0	0
	42	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
	56	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
1318	0	42	3	7	10	0	0	25	7	15	15	0	0	62	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	7	48	3	9	2	0	0	32	21	5	4	0	0	62	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	14	58	2	2	0	0	0	38	22	2	0	0	0	62	0	0	0	0	0	61	1	0	0	0	0
	28	55	5	2	0	0	0	46	12	4	0	0	0	62	0	0	0	0	0	61	1	0	0	0	0
	42	58	4	0	0	0	0	44	18	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	56	62	0	0	0	0	0	50	12	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0	61	1	0	0	0	0
1403	0	31	7	10	9	5	0	9	7	21	19	6	0	35	4	7	12	4	0	13	14	15	14	6	0

** 0 = Aucune lésion (peau normale), 1 = lésions légères, 2 ou 3 = lésions modérées, 4 ou 5 = lésions graves, DA = retrait en raison de l'aggravation des signes cliniques de dermatite atopique, ND = non disponible*

Tableau 2. Résultats des évaluations de chaque animal et scores de gravité des différents signes cliniques aux jours 0, 7, 14, 28, 42 et 56 de l'étude																									
Groupe placebo																									
		Signe clinique*																							
		Alopécie						Érythème						Excoriation						Lichénification					
		0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5
Animal	Jour de l'étude																								
1403	7	32	4	14	8	4	0	16	6	31	9	0	0	50	4	7	0	1	0	21	10	22	7	2	0
	14	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
	28	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
	42	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
	56	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
1407	0	34	1	12	10	5	0	34	15	6	7	0	0	62	0	0	0	0	0	37	14	10	1	0	0
	7	34	7	13	7	1	0	39	6	12	5	0	0	62	0	0	0	0	0	38	11	12	1	0	0
	14	40	3	10	9	0	0	34	15	7	5	1	0	62	0	0	0	0	0	47	10	5	0	0	0
	28	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
	42	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
	56	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
1410	0	54	3	3	2	0	0	26	10	17	9	0	0	60	1	1	0	0	0	46	4	7	5	0	0
	7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	14	49	2	3	6	2	0	12	9	19	19	3	0	54	0	2	5	1	0	37	7	4	8	6	0
	28	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
	42	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
	56	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
1414	0	59	0	0	2	1	0	38	1	14	8	1	0	60	0	0	1	1	0	54	5	1	2	0	0
	7	50	0	6	6	0	0	19	2	20	18	3	0	57	0	3	1	1	0	48	5	5	4	0	0
	14	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
	28	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
	42	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
	56	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
1417	0	50	5	3	4	0	0	10	20	16	15	1	0	60	1	1	0	0	0	29	14	13	6	0	0
	7	60	1	1	0	0	0	25	15	19	3	0	0	62	0	0	0	0	0	46	4	10	2	0	0
	14	54	2	5	1	0	0	25	11	20	6	0	0	59	0	3	0	0	0	46	5	6	4	1	0
	28	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	42	60	0	2	0	0	0	20	12	24	6	0	0	60	1	1	0	0	0	43	12	7	0	0	0
	56	54	3	5	0	0	0	17	16	17	9	3	0	60	1	1	0	0	0	41	13	7	1	0	0
1423	0	48	2	6	5	1	0	35	11	10	6	0	0	61	0	1	0	0	0	44	6	11	1	0	0
	7	43	3	6	10	0	0	32	15	11	4	0	0	59	1	1	1	0	0	38	7	15	2	0	0
	14	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
	28	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
	42	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA

* 0 = Aucune lésion (peau normale), 1 = lésions légères, 2 ou 3 = lésions modérées, 4 ou 5 = lésions graves,
 DA = retrait en raison de l'aggravation des signes cliniques de dermatite atopique, ND = non disponible

Tableau 2. Résultats des évaluations de chaque animal et scores de gravité des différents signes cliniques aux jours 0, 7, 14, 28, 42 et 56 de l'étude																									
Groupe placebo																									
		Signe clinique*																							
		Alopécie						Érythème						Excoriation						Lichénification					
		0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5
Animal	Jour de l'étude																								
1423	56	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
1425	0	37	8	11	2	4	0	14	12	27	9	0	0	55	1	4	1	1	0	47	4	10	1	0	0
	7	47	5	6	3	1	0	14	20	20	8	0	0	57	1	3	1	0	0	47	9	6	0	0	0
	14	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
	28	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
	42	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
	56	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
1432	0	53	0	6	1	2	0	31	5	12	11	3	0	55	1	2	3	1	0	51	5	3	3	0	0
	7	49	2	6	5	0	0	21	4	16	17	4	0	51	0	7	3	1	0	44	7	9	2	0	0
	14	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
	28	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
	42	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
	56	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
1435	0	60	1	0	1	0	0	31	6	16	6	3	0	56	0	3	3	0	0	47	1	1	10	3	0
	7	56	0	2	4	0	0	37	1	10	10	4	0	50	2	6	4	0	0	44	3	6	5	4	0
	14	50	1	6	5	0	0	28	2	22	7	3	0	49	2	3	7	1	0	43	2	6	7	4	0
	28	56	2	3	1	0	0	36	6	15	5	0	0	60	0	0	2	0	0	45	2	8	6	1	0
	42	49	0	4	7	2	0	35	4	11	9	3	0	55	0	5	2	0	0	49	1	1	8	3	0
	56	49	2	5	6	0	0	31	7	12	8	4	0	49	0	2	7	4	0	43	1	5	5	8	0
1439	0	51	2	5	3	1	0	32	4	14	8	4	0	56	1	0	2	3	0	42	5	4	6	4	1
	7	51	5	3	3	0	0	40	5	10	4	3	0	59	0	0	3	0	0	46	4	5	3	4	0
	14	49	3	8	1	1	0	39	4	12	6	1	0	56	0	4	2	0	0	47	2	5	4	4	0
	28	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
	42	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
	56	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
1442	0	37	1	10	9	3	2	19	7	9	18	9	0	52	0	4	4	2	0	42	7	6	7	0	0
	7	33	1	10	8	8	2	7	8	19	18	10	0	46	1	8	4	3	0	44	3	11	4	0	0
	14	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
	28	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
	42	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
	56	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
1446	0	50	3	6	3	0	0	32	9	12	7	2	0	60	0	1	1	0	0	50	4	5	2	1	0
	7	48	5	7	2	0	0	21	13	22	4	2	0	57	1	2	2	0	0	44	3	10	4	1	0

* 0 = Aucune lésion (peau normale), 1 = lésions légères, 2 ou 3 = lésions modérées, 4 ou 5 = lésions graves,
 DA = retrait en raison de l'aggravation des signes cliniques de dermatite atopique, ND = non disponible

Tableau 2. Résultats des évaluations de chaque animal et scores de gravité des différents signes cliniques aux jours 0, 7, 14, 28, 42 et 56 de l'étude

Groupe placebo																									
		Signe clinique*																							
		Alopécie						Érythème						Excoriation						Lichénification					
		0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5
Animal	Jour de l'étude																								
1446	14	59	1	0	2	0	0	35	11	11	4	1	0	60	0	1	1	0	0	48	2	7	5	0	0
	28	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
	42	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
	56	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
1703	0	37	10	15	0	0	0	32	14	12	4	0	0	61	0	1	0	0	0	60	2	0	0	0	0
	7	36	18	5	3	0	0	32	18	7	5	0	0	60	2	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	14	38	18	5	1	0	0	32	19	8	3	0	0	61	1	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	28	32	20	9	1	0	0	41	11	9	1	0	0	54	8	0	0	0	0	61	1	0	0	0	0
	42	35	14	10	3	0	0	39	13	9	1	0	0	62	0	0	0	0	0	61	1	0	0	0	0
	56	32	16	11	3	0	0	32	16	6	8	0	0	57	5	0	0	0	0	61	1	0	0	0	0
1706	0	34	12	6	4	5	1	6	16	19	17	4	0	50	9	1	2	0	0	54	6	1	1	0	0
	7	32	13	6	4	5	2	12	6	24	14	5	1	54	4	3	0	1	0	53	6	1	1	1	0
	14	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	
	28	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	
	42	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	
	56	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	
1712	0	17	15	10	11	7	2	28	16	12	5	1	0	57	5	0	0	0	0	51	6	1	1	3	0
	7	16	18	11	9	7	1	27	11	12	9	3	0	55	6	1	0	0	0	54	3	1	3	1	0
	14	22	11	12	8	8	1	30	20	7	4	1	0	55	5	2	0	0	0	48	7	2	2	3	0
	28	18	9	17	10	7	1	29	11	16	5	1	0	51	9	2	0	0	0	53	4	2	1	2	0
	42	18	18	14	7	4	1	30	11	9	10	2	0	53	7	0	2	0	0	52	3	2	3	2	0
	56	20	13	12	13	2	2	27	10	16	6	3	0	59	1	2	0	0	0	46	6	5	3	2	0
1714	0	36	12	9	4	1	0	46	14	2	0	0	0	58	3	0	1	0	0	62	0	0	0	0	0
	7	39	8	12	3	0	0	44	14	3	1	0	0	59	2	0	1	0	0	62	0	0	0	0	0
	14	34	13	8	5	2	0	41	14	7	0	0	0	56	4	2	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	28	34	10	13	5	0	0	41	13	7	1	0	0	58	2	1	1	0	0	62	0	0	0	0	0
	42	37	9	9	7	0	0	51	7	3	1	0	0	59	2	0	1	0	0	62	0	0	0	0	0
	56	43	6	9	4	0	0	48	11	3	0	0	0	61	0	1	0	0	0	62	0	0	0	0	0
1806	0	55	2	3	1	0	1	24	25	9	3	0	1	61	1	0	0	0	0	59	1	1	0	0	1
	7	55	5	1	0	1	0	21	29	12	0	0	0	62	0	0	0	0	0	61	1	0	0	0	0
	14	60	1	1	0	0	0	34	22	6	0	0	0	62	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	28	58	3	1	0	0	0	22	28	12	0	0	0	61	0	1	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	42	61	1	0	0	0	0	31	13	15	3	0	0	62	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	56	60	2	0	0	0	0	18	28	13	3	0	0	62	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0

* 0 = Aucune lésion (peau normale), 1 = lésions légères, 2 ou 3 = lésions modérées, 4 ou 5 = lésions graves, DA = retrait en raison de l'aggravation des signes cliniques de dermatite atopique, ND = non disponible

Tableau 2. Résultats des évaluations de chaque animal et scores de gravité des différents signes cliniques aux jours 0, 7, 14, 28, 42 et 56 de l'étude																									
Groupe placebo																									
		Signe clinique*																							
		Alopécie						Érythème						Excoriation						Lichénification					
		0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5
Animal	Jour de l'étude																								
1904	0	54	4	2	2	0	0	30	8	16	8	0	0	61	1	0	0	0	0	49	10	3	0	0	0
	7	55	5	0	2	0	0	39	17	5	1	0	0	62	0	0	0	0	0	53	9	0	0	0	0
	14	43	14	3	1	1	0	27	19	13	3	0	0	61	1	0	0	0	0	51	9	2	0	0	0
	28	41	15	3	2	1	0	29	13	16	3	1	0	62	0	0	0	0	0	50	10	1	1	0	0
	42	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
	56	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
2001	0	52	1	4	3	1	1	49	1	5	4	1	2	59	1	2	0	0	0	60	0	0	1	1	0
	7	50	3	1	4	1	3	45	6	2	6	2	1	62	0	0	0	0	0	60	0	0	1	1	0
	14	45	4	1	5	4	3	36	4	8	3	5	6	57	0	5	0	0	0	52	0	6	0	4	0
	28	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
	42	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
	56	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
2008	0	39	14	7	2	0	0	28	9	16	9	0	0	61	1	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	7	33	13	12	4	0	0	12	20	16	12	2	0	62	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	14	35	14	6	3	2	2	17	12	24	6	1	2	59	1	1	0	1	0	62	0	0	0	0	0
	28	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
	42	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
	56	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
2012	0	50	6	4	1	1	0	39	5	8	9	1	0	57	1	3	0	1	0	62	0	0	0	0	0
	7	58	2	2	0	0	0	51	3	6	2	0	0	62	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	14	60	0	0	0	1	1	48	9	3	0	1	1	58	2	1	1	0	0	60	0	2	0	0	0
	28	54	5	2	0	1	0	44	5	7	3	2	1	56	3	2	1	0	0	61	1	0	0	0	0
	42	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
	56	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
2016	0	24	15	14	6	1	2	15	9	13	16	7	2	62	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	7	27	17	7	7	1	3	16	20	10	5	8	3	62	0	0	0	0	0	59	3	0	0	0	0
	14	19	12	13	11	3	4	30	19	8	2	3	0	61	0	1	0	0	0	57	0	4	1	0	0
	28	21	15	10	11	5	0	29	14	6	8	4	1	62	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	42	16	10	17	11	8	0	28	16	17	1	0	0	62	0	0	0	0	0	58	0	4	0	0	0
	56	25	13	14	4	6	0	24	5	20	12	1	0	62	0	0	0	0	0	59	0	1	2	0	0
2019	0	40	4	13	3	2	0	31	8	17	6	0	0	61	1	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	7	50	2	8	2	0	0	47	2	12	1	0	0	59	1	1	1	0	0	60	1	1	0	0	0
	14	30	1	13	11	7	0	24	9	15	11	2	1	57	0	2	2	1	0	62	0	0	0	0	0
	28	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA

* 0 = Aucune lésion (peau normale), 1 = lésions légères, 2 ou 3 = lésions modérées, 4 ou 5 = lésions graves,
 DA = retrait en raison de l'aggravation des signes cliniques de dermatite atopique, ND = non disponible

Tableau 2. Résultats des évaluations de chaque animal et scores de gravité des différents signes cliniques aux jours 0, 7, 14, 28, 42 et 56 de l'étude																									
Groupe placebo																									
		Signe clinique*																							
		Alopécie						Érythème						Excoriation						Lichénification					
		0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5
Animal	Jour de l'étude																								
2019	42	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
	56	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
2021	0	37	8	11	2	4	0	25	5	18	11	2	1	60	0	2	0	0	0	60	1	1	0	0	0
	7	24	6	21	7	4	0	25	4	20	10	3	0	50	1	5	6	0	0	47	2	6	7	0	0
	14	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
	28	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
	42	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
	56	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
2102	0	62	0	0	0	0	0	20	29	11	2	0	0	60	2	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	7	62	0	0	0	0	0	21	28	11	2	0	0	61	0	1	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	14	62	0	0	0	0	0	23	32	7	0	0	0	59	1	1	1	0	0	62	0	0	0	0	0
	28	62	0	0	0	0	0	30	27	5	0	0	0	61	1	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	42	62	0	0	0	0	0	27	32	3	0	0	0	62	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	56	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2108	0	54	4	2	2	0	0	2	37	20	3	0	0	62	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	7	58	3	1	0	0	0	0	40	17	4	1	0	58	2	2	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	14	53	5	4	0	0	0	0	32	23	4	2	1	59	1	1	0	1	0	62	0	0	0	0	0
	28	50	0	10	2	0	0	0	36	20	4	2	0	56	4	1	1	0	0	62	0	0	0	0	0
	42	46	3	6	7	0	0	0	31	24	5	2	0	56	0	3	0	1	2	62	0	0	0	0	0
	56	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
2111	0	62	0	0	0	0	0	6	17	35	4	0	0	61	1	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	7	62	0	0	0	0	0	6	18	31	7	0	0	62	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	14	62	0	0	0	0	0	8	10	27	15	2	0	62	0	0	0	0	0	61	1	0	0	0	0
	28	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
	42	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
	56	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
2113	0	61	1	0	0	0	0	14	39	9	0	0	0	62	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	7	62	0	0	0	0	0	13	36	11	2	0	0	62	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	14	62	0	0	0	0	0	17	39	6	0	0	0	62	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	28	62	0	0	0	0	0	22	29	11	0	0	0	62	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	42	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	56	62	0	0	0	0	0	12	31	18	1	0	0	62	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
2202	0	61	0	1	0	0	0	25	23	11	2	1	0	61	0	0	1	0	0	58	1	3	0	0	0

** 0 = Aucune lésion (peau normale), 1 = lésions légères, 2 ou 3 = lésions modérées, 4 ou 5 = lésions graves, DA = retrait en raison de l'aggravation des signes cliniques de dermatite atopique, ND = non disponible*

Tableau 2. Résultats des évaluations de chaque animal et scores de gravité des différents signes cliniques aux jours 0, 7, 14, 28, 42 et 56 de l'étude																									
Groupe placebo																									
		Signe clinique*																							
		Alopécie						Érythème						Excoriation						Lichénification					
		0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5
Animal	Jour de l'étude																								
2202	7	58	2	2	0	0	0	26	15	15	6	0	0	60	1	1	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	28	59	2	1	0	0	0	38	12	12	0	0	0	59	2	1	0	0	0	58	2	0	2	0	0
	42	59	1	1	1	0	0	34	18	9	1	0	0	61	1	0	0	0	0	59	1	2	0	0	0
	56	56	6	0	0	0	0	43	17	2	0	0	0	62	0	0	0	0	0	60	2	0	0	0	0
2207	0	58	3	1	0	0	0	47	11	4	0	0	0	58	4	0	0	0	0	59	0	3	0	0	0
	7	52	5	5	0	0	0	37	19	6	0	0	0	61	0	1	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	14	55	6	1	0	0	0	49	7	4	2	0	0	60	1	1	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	28	36	14	11	0	0	1	41	16	3	2	0	0	58	1	2	1	0	0	59	3	0	0	0	0
	42	45	13	2	2	0	0	56	5	1	0	0	0	61	0	1	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	56	56	4	1	1	0	0	56	4	2	0	0	0	59	1	2	0	0	0	62	0	0	0	0	0
2301	0	57	1	4	0	0	0	19	36	6	1	0	0	62	0	0	0	0	0	61	1	0	0	0	0
	7	48	14	0	0	0	0	28	34	0	0	0	0	61	1	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	14	62	0	0	0	0	0	39	23	0	0	0	0	61	1	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	28	62	0	0	0	0	0	47	15	0	0	0	0	61	1	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	42	62	0	0	0	0	0	41	19	2	0	0	0	60	1	1	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	56	62	0	0	0	0	0	31	30	1	0	0	0	61	1	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
2306	0	40	3	7	4	8	0	31	14	2	7	8	0	60	1	1	0	0	0	61	0	1	0	0	0
	7	46	6	7	3	0	0	38	16	5	3	0	0	62	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	14	42	11	2	0	7	0	35	15	4	7	1	0	62	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	28	43	9	2	8	0	0	32	9	9	4	8	0	60	2	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	42	39	7	3	5	8	0	23	16	6	7	10	0	61	1	0	0	0	0	61	0	1	0	0	0
	56	37	7	6	4	8	0	27	10	9	10	6	0	62	0	0	0	0	0	60	0	2	0	0	0
2404	0	15	15	8	10	7	7	12	37	12	1	0	0	47	11	3	1	0	0	22	28	4	6	2	0
	7	8	21	8	10	6	9	10	41	8	2	1	0	42	18	1	1	0	0	9	29	13	4	4	3
	14	8	27	12	3	11	1	26	32	3	1	0	0	51	11	0	0	0	0	26	23	8	4	0	1
	28	9	18	12	9	11	3	20	27	12	1	0	2	47	14	1	0	0	0	16	26	13	5	1	1
	42	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
	56	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
2406	0	21	28	9	4	0	0	36	14	11	0	1	0	58	3	0	1	0	0	16	32	12	2	0	0
	7	25	29	7	1	0	0	43	14	3	1	1	0	59	1	0	2	0	0	18	36	7	1	0	0
	14	44	18	0	0	0	0	53	6	3	0	0	0	62	0	0	0	0	0	30	31	1	0	0	0
	28	40	20	2	0	0	0	58	3	1	0	0	0	62	0	0	0	0	0	41	21	0	0	0	0
	42	38	22	2	0	0	0	58	4	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0	37	22	3	0	0	0

* 0 = Aucune lésion (peau normale), 1 = lésions légères, 2 ou 3 = lésions modérées, 4 ou 5 = lésions graves,
 DA = retrait en raison de l'aggravation des signes cliniques de dermatite atopique, ND = non disponible

Tableau 2. Résultats des évaluations de chaque animal et scores de gravité des différents signes cliniques aux jours 0, 7, 14, 28, 42 et 56 de l'étude																									
Groupe placebo																									
		Signe clinique*																							
		Alopécie						Érythème						Excoriation						Lichénification					
		0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5
Animal	Jour de l'étude																								
2406	56	24	30	6	2	0	0	48	8	4	1	1	0	59	1	0	0	1	1	26	27	8	1	0	0
2411	0	6	27	8	8	10	3	36	23	2	1	0	0	58	4	0	0	0	0	14	38	9	1	0	0
	7	21	26	7	3	4	1	52	7	0	3	0	0	61	1	0	0	0	0	33	25	3	1	0	0
	14	43	15	3	0	1	0	60	2	0	0	0	0	61	1	0	0	0	0	51	11	0	0	0	0
	28	35	21	1	4	0	1	54	6	1	1	0	0	59	3	0	0	0	0	49	9	3	1	0	0
	42	29	21	10	2	0	0	56	2	2	2	0	0	55	7	0	0	0	0	40	18	4	0	0	0
	56	41	12	7	0	2	0	56	3	1	2	0	0	58	2	2	0	0	0	43	14	3	2	0	0
2414	0	23	32	6	1	0	0	30	27	5	0	0	0	58	4	0	0	0	0	38	20	4	0	0	0
	7	42	20	0	0	0	0	49	11	2	0	0	0	60	2	0	0	0	0	53	9	0	0	0	0
	14	35	22	4	1	0	0	45	14	3	0	0	0	57	5	0	0	0	0	51	8	3	0	0	0
	28	46	16	0	0	0	0	47	14	1	0	0	0	62	0	0	0	0	0	56	6	0	0	0	0
	42	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	56	44	18	0	0	0	0	44	18	0	0	0	0	61	1	0	0	0	0	57	4	1	0	0	0
2419	0	23	31	8	0	0	0	52	6	4	0	0	0	61	1	0	0	0	0	34	26	2	0	0	0
	7	23	39	0	0	0	0	40	17	5	0	0	0	62	0	0	0	0	0	47	15	0	0	0	0
	14	44	18	0	0	0	0	59	3	0	0	0	0	61	1	0	0	0	0	53	9	0	0	0	0
	28	48	12	2	0	0	0	58	4	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0	55	7	0	0	0	0
	42	42	20	0	0	0	0	60	2	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0	57	5	0	0	0	0
	56	52	10	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0	57	5	0	0	0	0
2421	0	37	19	5	1	0	0	41	18	2	1	0	0	61	1	0	0	0	0	46	16	0	0	0	0
	7	47	14	1	0	0	0	59	3	0	0	0	0	61	1	0	0	0	0	60	2	0	0	0	0
	14	53	9	0	0	0	0	56	5	1	0	0	0	62	0	0	0	0	0	55	7	0	0	0	0
	28	53	9	0	0	0	0	60	2	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0	59	3	0	0	0	0
	42	54	8	0	0	0	0	61	1	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0	61	1	0	0	0	0
	56	58	4	0	0	0	0	60	2	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0	61	1	0	0	0	0
2426	0	26	26	10	0	0	0	36	23	2	1	0	0	54	4	2	2	0	0	42	16	4	0	0	0
	7	49	13	0	0	0	0	56	6	0	0	0	0	59	2	1	0	0	0	50	11	1	0	0	0
	14	34	25	2	1	0	0	46	13	3	0	0	0	52	7	3	0	0	0	46	11	5	0	0	0
	28	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
	42	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
	56	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA

* 0 = Aucune lésion (peau normale), 1 = lésions légères, 2 ou 3 = lésions modérées, 4 ou 5 = lésions graves, DA = retrait en raison de l'aggravation des signes cliniques de dermatite atopique, ND = non disponible

Tableau 3. Résultats des évaluations de chaque animal et scores de gravité des différents signes cliniques aux jours 0, 7, 14, 28, 42 et 56 de l'étude																									
		Groupe du produit à l'étude																							
		Signe clinique*																							
		Alopécie						Érythème						Excoriation						Lichénification					
		0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5
Animal	Jour de l'étude																								
1002	0	49	0	9	4	0	0	44	0	9	9	0	0	62	0	0	0	0	0	53	0	8	1	0	0
	7	60	0	2	0	0	0	45	0	13	4	0	0	62	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	14	53	8	1	0	0	0	47	6	9	0	0	0	62	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	28	59	0	3	0	0	0	49	0	9	4	0	0	62	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	42	54	8	0	0	0	0	48	14	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	56	62	0	0	0	0	0	47	9	5	1	0	0	62	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
1006	0	60	0	2	0	0	0	43	1	11	3	4	0	62	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	7	61	0	1	0	0	0	46	4	3	9	0	0	62	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	14	61	0	1	0	0	0	48	2	12	0	0	0	62	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	28	62	0	0	0	0	0	45	9	8	0	0	0	62	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	42	62	0	0	0	0	0	50	0	12	0	0	0	62	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	56	62	0	0	0	0	0	44	7	8	3	0	0	62	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
1103	0	39	3	8	12	0	0	31	3	11	17	0	0	36	4	8	14	0	0	36	4	8	14	0	0
	7	62	0	0	0	0	0	39	13	10	0	0	0	62	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	14	62	0	0	0	0	0	39	23	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	28	62	0	0	0	0	0	32	28	2	0	0	0	62	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	42	62	0	0	0	0	0	19	41	2	0	0	0	62	0	0	0	0	0	60	2	0	0	0	0
	56	58	4	0	0	0	0	17	42	3	0	0	0	56	6	0	0	0	0	60	2	0	0	0	0
1107	0	7	1	20	7	24	3	0	0	6	12	32	12	2	0	22	9	25	4	2	0	22	9	25	4
	7	17	42	3	0	0	0	2	4	56	0	0	0	27	35	0	0	0	0	38	24	0	0	0	0
	14	21	37	4	0	0	0	3	49	9	1	0	0	41	18	3	0	0	0	49	10	3	0	0	0
	28	2	25	35	0	0	0	0	0	51	11	0	0	12	12	35	3	0	0	21	13	27	1	0	0
	42	4	42	16	0	0	0	0	5	36	21	0	0	11	25	23	3	0	0	20	19	22	1	0	0
	56	3	18	14	24	3	0	0	0	22	36	4	0	8	15	19	19	1	0	16	12	20	14	0	0
1112	0	24	20	17	1	0	0	0	0	16	46	0	0	32	5	24	1	0	0	34	8	20	0	0	0
	7	36	26	0	0	0	0	10	28	24	0	0	0	62	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	14	54	6	2	0	0	0	15	39	7	1	0	0	59	3	0	0	0	0	59	3	0	0	0	0
	28	38	21	2	1	0	0	15	1	3	43	0	0	48	11	2	1	0	0	60	2	0	0	0	0
	42	60	2	0	0	0	0	36	0	23	3	0	0	60	1	1	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	56	62	0	0	0	0	0	37	16	8	1	0	0	62	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0

** 0 = Aucune lésion (peau normale), 1 = lésions légères, 2 ou 3 = lésions modérées, 4 ou 5 = lésions graves, DA = retrait en raison de l'aggravation des signes cliniques de dermatite atopique, ND = non disponible*

Tableau 3. Résultats des évaluations de chaque animal et scores de gravité des différents signes cliniques aux jours 0, 7, 14, 28, 42 et 56 de l'étude																									
		Groupe du produit à l'étude																							
		Signe clinique*																							
		Alopécie						Érythème						Excoriation						Lichénification					
		0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5
Animal	Jour de l'étude																								
1204	0	27	28	7	0	0	0	1	10	33	17	1	0	56	6	0	0	0	0	34	23	5	0	0	0
	7	47	13	2	0	0	0	3	25	27	7	0	0	58	4	0	0	0	0	42	15	5	0	0	0
	14	50	10	2	0	0	0	10	21	28	3	0	0	60	2	0	0	0	0	36	24	2	0	0	0
	28	51	11	0	0	0	0	18	31	13	0	0	0	62	0	0	0	0	0	43	17	2	0	0	0
	42	54	7	1	0	0	0	25	27	9	1	0	0	60	2	0	0	0	0	44	16	2	0	0	0
	56	51	11	0	0	0	0	22	35	4	1	0	0	60	2	0	0	0	0	50	11	1	0	0	0
1205	0	45	14	3	0	0	0	6	31	22	3	0	0	60	2	0	0	0	0	36	15	11	0	0	0
	7	47	12	3	0	0	0	13	40	8	1	0	0	61	1	0	0	0	0	25	30	7	0	0	0
	14	51	10	1	0	0	0	18	36	8	0	0	0	61	1	0	0	0	0	31	22	9	0	0	0
	28	48	12	2	0	0	0	29	28	5	0	0	0	60	2	0	0	0	0	41	17	3	1	0	0
	42	53	6	3	0	0	0	26	33	2	1	0	0	62	0	0	0	0	0	45	15	2	0	0	0
	56	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1210	0	14	20	14	7	7	0	19	20	12	10	1	0	52	8	2	0	0	0	20	16	19	5	2	0
	7	23	19	11	9	0	0	32	16	11	3	0	0	62	0	0	0	0	0	26	17	15	3	1	0
	14	25	19	13	5	0	0	26	18	13	5	0	0	62	0	0	0	0	0	30	17	10	5	0	0
	28	31	15	12	4	0	0	27	20	10	5	0	0	58	4	0	0	0	0	28	17	16	1	0	0
	42	30	22	8	2	0	0	26	9	15	10	2	0	56	4	2	0	0	0	23	19	14	6	0	0
	56	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
1304	0	35	9	7	6	3	2	9	21	18	12	2	0	44	15	2	1	0	0	42	6	5	5	4	0
	7	20	16	11	12	3	0	4	32	18	6	2	0	55	6	1	0	0	0	36	10	8	7	1	0
	14	36	14	8	4	0	0	16	23	16	7	0	0	62	0	0	0	0	0	48	7	4	3	0	0
	28	25	15	8	12	2	0	17	22	18	5	0	0	59	3	0	0	0	0	49	4	5	4	0	0
	42	25	17	9	10	1	0	15	19	14	14	0	0	58	4	0	0	0	0	40	5	8	9	0	0
	56	19	14	14	9	6	0	15	11	17	19	0	0	49	10	3	0	0	0	34	7	11	10	0	0
1306	0	52	7	3	0	0	0	27	22	7	4	2	0	59	3	0	0	0	0	53	5	3	1	0	0
	7	49	10	3	0	0	0	35	20	5	2	0	0	61	1	0	0	0	0	51	10	1	0	0	0
	14	53	8	1	0	0	0	44	13	2	3	0	0	62	0	0	0	0	0	59	2	1	0	0	0
	28	55	6	1	0	0	0	34	11	12	5	0	0	57	2	3	0	0	0	57	3	2	0	0	0
	42	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
	56	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA

** 0 = Aucune lésion (peau normale), 1 = lésions légères, 2 ou 3 = lésions modérées, 4 ou 5 = lésions graves, DA = retrait en raison de l'aggravation des signes cliniques de dermatite atopique, ND = non disponible*

Tableau 3. Résultats des évaluations de chaque animal et scores de gravité des différents signes cliniques aux jours 0, 7, 14, 28, 42 et 56 de l'étude																									
		Groupe du produit à l'étude																							
		Signe clinique*																							
		Alopécie						Érythème						Excoriation						Lichénification					
		0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5
Animal	Jour de l'étude																								
1312	0	26	6	21	6	2	1	5	15	19	17	6	0	62	0	0	0	0	0	36	13	8	3	2	0
	7	40	10	8	3	0	1	22	20	13	7	0	0	61	1	0	0	0	0	42	11	6	3	0	0
	14	30	5	16	4	7	0	10	19	9	15	9	0	59	2	1	0	0	0	28	13	10	7	4	0
	28	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
	42	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
	56	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
1314	0	20	9	18	11	4	0	4	10	17	31	0	0	41	6	12	3	0	0	54	4	3	1	0	0
	7	31	6	20	5	0	0	12	20	18	12	0	0	57	4	1	0	0	0	48	9	5	0	0	0
	14	39	7	11	5	0	0	17	18	19	8	0	0	61	1	0	0	0	0	56	4	2	0	0	0
	28	60	2	0	0	0	0	22	19	19	2	0	0	62	0	0	0	0	0	56	4	2	0	0	0
	42	61	1	0	0	0	0	38	21	3	0	0	0	62	0	0	0	0	0	59	3	0	0	0	0
	56	61	1	0	0	0	0	38	15	9	0	0	0	62	0	0	0	0	0	56	5	1	0	0	0
1317	0	59	3	0	0	0	0	27	11	17	7	0	0	62	0	0	0	0	0	57	3	2	0	0	0
	7	53	7	1	1	0	0	30	15	16	1	0	0	62	0	0	0	0	0	58	4	0	0	0	0
	14	57	1	3	1	0	0	32	23	7	0	0	0	62	0	0	0	0	0	58	4	0	0	0	0
	28	55	5	2	0	0	0	32	24	6	0	0	0	61	1	0	0	0	0	58	3	1	0	0	0
	42	55	5	2	0	0	0	33	22	7	0	0	0	62	0	0	0	0	0	57	4	1	0	0	0
	56	54	6	2	0	0	0	33	17	12	0	0	0	62	0	0	0	0	0	60	2	0	0	0	0
1402	0	55	3	3	1	0	0	21	2	22	17	0	0	56	1	4	1	0	0	40	8	10	4	0	0
	7	57	1	3	1	0	0	34	5	17	6	0	0	61	0	1	0	0	0	47	7	6	2	0	0
	14	58	2	2	0	0	0	31	11	19	1	0	0	62	0	0	0	0	0	52	8	2	0	0	0
	28	58	3	1	0	0	0	41	8	12	1	0	0	61	0	0	1	0	0	55	4	2	1	0	0
	42	59	0	3	0	0	0	27	19	10	5	1	0	61	1	0	0	0	0	50	7	4	1	0	0
	56	58	1	1	2	0	0	21	16	11	14	0	0	60	0	0	2	0	0	50	3	7	1	1	0
1406	0	46	1	7	8	0	0	34	6	10	12	0	0	58	1	2	1	0	0	43	8	8	3	0	0
	7	52	1	5	4	0	0	39	7	10	5	1	0	58	1	3	0	0	0	50	3	4	3	2	0
	14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	28	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	42	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	56	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

* 0 = Aucune lésion (peau normale), 1 = lésions légères, 2 ou 3 = lésions modérées, 4 ou 5 = lésions graves, DA = retrait en raison de l'aggravation des signes cliniques de dermatite atopique, ND = non disponible

Tableau 3. Résultats des évaluations de chaque animal et scores de gravité des différents signes cliniques aux jours 0, 7, 14, 28, 42 et 56 de l'étude																									
		Groupe du produit à l'étude																							
		Signe clinique*																							
		Alopécie						Érythème						Excoriation						Lichénification					
		0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5
Animal	Jour de l'étude																								
1412	0	45	7	7	2	1	0	25	7	19	11	0	0	60	0	1	1	0	0	35	7	11	8	1	0
	7	55	3	3	0	1	0	32	3	12	15	0	0	58	1	1	2	0	0	38	13	6	5	0	0
	14	57	2	2	0	1	0	35	6	18	3	0	0	62	0	0	0	0	0	45	8	8	1	0	0
	28	53	4	4	1	0	0	36	4	10	12	0	0	62	0	0	0	0	0	42	9	9	2	0	0
	42	57	1	1	2	1	0	35	6	8	13	0	0	60	0	2	0	0	0	42	8	11	1	0	0
	56	59	0	0	2	1	0	37	6	9	10	0	0	58	2	1	0	1	0	48	2	8	3	1	0
1413	0	58	2	2	0	0	0	9	18	22	13	0	0	62	0	0	0	0	0	45	9	6	2	0	0
	7	55	6	1	0	0	0	15	25	20	2	0	0	60	0	2	0	0	0	49	4	7	2	0	0
	14	53	4	3	2	0	0	15	15	26	6	0	0	60	0	2	0	0	0	44	4	9	5	0	0
	28	53	4	4	1	0	0	21	5	24	9	3	0	54	0	2	4	2	0	44	6	5	2	5	0
	42	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
	56	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
1420	0	58	1	3	0	0	0	39	5	11	6	1	0	58	0	2	2	0	0	53	4	5	0	0	0
	7	59	2	1	0	0	0	45	5	6	6	0	0	62	0	0	0	0	0	55	7	0	0	0	0
	14	59	1	2	0	0	0	48	0	5	8	1	0	62	0	0	0	0	0	55	5	2	0	0	0
	28	61	1	0	0	0	0	43	6	9	3	1	0	62	0	0	0	0	0	55	6	1	0	0	0
	42	59	2	0	1	0	0	47	3	8	2	2	0	61	0	1	0	0	0	51	4	6	1	0	0
	56	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
1424	0	57	1	3	1	0	0	41	10	6	5	0	0	58	1	2	1	0	0	50	4	4	2	2	0
	7	57	2	2	1	0	0	43	7	6	6	0	0	61	0	1	0	0	0	50	5	4	1	2	0
	14	59	2	1	0	0	0	42	5	10	5	0	0	59	0	1	1	1	0	51	1	5	4	1	0
	28	61	0	0	0	1	0	45	4	12	1	0	0	54	1	4	2	1	0	54	1	2	3	2	0
	42	52	0	2	2	5	1	37	7	8	8	2	0	54	0	2	1	5	0	45	3	6	1	5	2
	56	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
1427	0	52	2	7	1	0	0	42	4	5	9	2	0	59	0	0	2	1	0	44	6	10	2	0	0
	7	61	0	1	0	0	0	46	1	12	3	0	0	58	0	4	0	0	0	54	0	7	1	0	0
	14	57	1	0	4	0	0	49	5	5	3	0	0	60	0	2	0	0	0	51	3	4	4	0	0
	28	54	1	7	0	0	0	45	4	8	5	0	0	60	0	2	0	0	0	46	2	8	5	1	0
	42	57	0	4	1	0	0	49	4	6	3	0	0	62	0	0	0	0	0	53	3	5	1	0	0
	56	58	0	4	0	0	0	52	2	4	3	1	0	62	0	0	0	0	0	54	1	4	3	0	0

*** 0 = Aucune lésion (peau normale), 1 = lésions légères, 2 ou 3 = lésions modérées, 4 ou 5 = lésions graves, DA = retrait en raison de l'aggravation des signes cliniques de dermatite atopique, ND = non disponible**

Tableau 3. Résultats des évaluations de chaque animal et scores de gravité des différents signes cliniques aux jours 0, 7, 14, 28, 42 et 56 de l'étude																									
		Groupe du produit à l'étude																							
		Signe clinique*																							
		Alopécie						Érythème						Excoriation						Lichénification					
		0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5
Animal	Jour de l'étude																								
1430	0	59	2	1	0	0	0	34	12	11	5	0	0	58	1	2	1	0	0	51	4	5	2	0	0
	7	57	1	3	1	0	0	39	6	13	4	0	0	60	0	2	0	0	0	53	3	6	0	0	0
	14	59	1	2	0	0	0	32	6	17	6	1	0	61	0	1	0	0	0	52	4	3	3	0	0
	28	52	4	6	0	0	0	27	0	22	10	3	0	61	1	0	0	0	0	52	1	7	2	0	0
	42	57	1	3	1	0	0	39	3	15	5	0	0	61	1	0	0	0	0	58	0	2	2	0	0
	56	61	0	1	0	0	0	37	10	9	6	0	0	62	0	0	0	0	0	53	4	5	0	0	0
1434	0	45	1	6	9	1	0	13	11	23	14	1	0	45	1	4	12	0	0	36	5	11	10	0	0
	7	35	2	15	9	1	0	15	11	25	11	0	0	54	1	5	2	0	0	38	7	11	5	1	0
	14	41	3	13	4	1	0	18	12	24	7	1	0	53	1	4	4	0	0	46	1	12	3	0	0
	28	38	2	15	7	0	0	24	6	25	7	0	0	58	0	3	1	0	0	43	2	8	9	0	0
	42	41	5	14	2	0	0	26	8	16	12	0	0	60	0	1	1	0	0	43	9	6	3	1	0
	56	53	3	5	1	0	0	35	7	11	9	0	0	59	1	0	2	0	0	50	4	6	2	0	0
1438	0	49	6	4	3	0	0	14	9	20	16	3	0	60	0	0	2	0	0	50	7	3	2	0	0
	7	55	1	2	4	0	0	26	8	14	14	0	0	62	0	0	0	0	0	53	4	4	1	0	0
	14	52	2	8	0	0	0	32	10	14	6	0	0	62	0	0	0	0	0	56	3	3	0	0	0
	28	55	1	6	0	0	0	27	2	19	14	0	0	62	0	0	0	0	0	56	0	6	0	0	0
	42	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
	56	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
1443	0	46	4	3	5	4	0	26	4	17	13	2	0	55	1	3	3	0	0	46	2	9	4	1	0
	7	44	0	8	7	3	0	20	6	17	16	3	0	54	1	5	2	0	0	39	1	18	4	0	0
	14	47	2	8	2	3	0	31	5	18	6	2	0	59	0	1	1	1	0	48	2	8	4	0	0
	28	51	3	0	6	2	0	32	3	19	8	0	0	57	1	2	2	0	0	43	4	14	1	0	0
	42	42	2	7	9	2	0	25	7	20	9	1	0	57	1	3	1	0	0	41	3	13	4	1	0
	56	55	0	4	3	0	0	40	3	14	5	0	0	59	1	2	0	0	0	54	3	4	1	0	0
1447	0	55	3	3	1	0	0	23	12	17	10	0	0	59	0	3	0	0	0	44	9	7	2	0	0
	7	58	2	2	0	0	0	32	8	17	5	0	0	60	1	1	0	0	0	46	7	8	1	0	0
	14	59	1	2	0	0	0	28	7	22	5	0	0	61	0	1	0	0	0	50	9	3	0	0	0
	28	60	0	2	0	0	0	26	15	19	2	0	0	62	0	0	0	0	0	49	3	10	0	0	0
	42	59	2	1	0	0	0	39	8	13	2	0	0	62	0	0	0	0	0	53	4	5	0	0	0
	56	57	2	3	0	0	0	34	5	18	5	0	0	60	0	2	0	0	0	54	0	8	0	0	0

*** 0 = Aucune lésion (peau normale), 1 = lésions légères, 2 ou 3 = lésions modérées, 4 ou 5 = lésions graves, DA = retrait en raison de l'aggravation des signes cliniques de dermatite atopique, ND = non disponible**

Tableau 3. Résultats des évaluations de chaque animal et scores de gravité des différents signes cliniques aux jours 0, 7, 14, 28, 42 et 56 de l'étude																									
		Groupe du produit à l'étude																							
		Signe clinique*																							
		Alopécie						Érythème						Excoriation						Lichénification					
		0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5
Animal	Jour de l'étude																								
1702	0	53	7	0	2	0	0	33	16	11	2	0	0	60	2	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	7	59	2	1	0	0	0	30	17	10	5	0	0	62	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	14	61	1	0	0	0	0	35	13	14	0	0	0	61	1	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	28	54	8	0	0	0	0	35	12	11	4	0	0	59	3	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	42	56	6	0	0	0	0	34	11	12	5	0	0	62	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	56	61	1	0	0	0	0	34	18	10	0	0	0	62	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
1707	0	22	13	16	10	1	0	10	15	22	13	2	0	55	4	2	1	0	0	60	0	0	2	0	0
	7	32	9	17	4	0	0	24	22	10	6	0	0	55	7	0	0	0	0	60	1	1	0	0	0
	14	30	13	19	0	0	0	32	22	7	1	0	0	60	2	0	0	0	0	60	1	1	0	0	0
	28	40	13	6	3	0	0	28	23	9	2	0	0	58	4	0	0	0	0	60	1	1	0	0	0
	42	41	12	8	1	0	0	30	15	15	2	0	0	57	5	0	0	0	0	60	0	2	0	0	0
	56	36	15	10	1	0	0	32	20	9	1	0	0	60	2	0	0	0	0	61	1	0	0	0	0
1711	0	37	10	3	5	3	4	25	12	15	8	2	0	52	3	3	3	1	0	51	6	4	0	1	0
	7	35	9	8	4	5	1	23	20	12	6	1	0	54	3	3	2	0	0	53	8	0	1	0	0
	14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	28	40	8	5	5	4	0	32	17	9	4	0	0	60	2	0	0	0	0	53	7	2	0	0	0
	42	41	9	3	3	4	2	28	19	8	7	0	0	59	3	0	0	0	0	53	5	3	1	0	0
	56	40	12	5	2	3	0	24	23	11	3	1	0	62	0	0	0	0	0	56	4	2	0	0	0
1801	0	57	2	0	3	0	0	29	16	10	4	3	0	55	2	4	0	1	0	51	6	3	2	0	0
	7	57	1	4	0	0	0	35	11	7	6	3	0	60	0	2	0	0	0	54	3	3	2	0	0
	14	60	1	1	0	0	0	43	7	4	7	1	0	59	0	3	0	0	0	54	3	4	1	0	0
	28	60	0	2	0	0	0	39	11	10	2	0	0	61	0	1	0	0	0	53	8	1	0	0	0
	42	54	4	4	0	0	0	34	11	8	9	0	0	58	2	2	0	0	0	47	5	5	5	0	0
	56	52	0	9	1	0	0	32	12	4	9	5	0	55	1	5	0	1	0	50	0	5	7	0	0
1808	0	56	1	4	1	0	0	24	16	16	6	0	0	57	3	1	1	0	0	50	7	3	2	0	0
	7	59	2	1	0	0	0	38	12	9	3	0	0	60	1	1	0	0	0	52	3	7	0	0	0
	14	60	1	1	0	0	0	31	11	17	3	0	0	58	1	3	0	0	0	53	2	7	0	0	0
	28	55	0	6	1	0	0	18	14	19	11	0	0	55	0	6	1	0	0	42	3	16	1	0	0
	42	62	0	0	0	0	0	45	2	11	4	0	0	61	0	1	0	0	0	60	0	2	0	0	0
	56	61	0	1	0	0	0	28	8	16	9	1	0	58	0	4	0	0	0	54	2	4	2	0	0

* 0 = Aucune lésion (peau normale), 1 = lésions légères, 2 ou 3 = lésions modérées, 4 ou 5 = lésions graves,
 DA = retrait en raison de l'aggravation des signes cliniques de dermatite atopique, ND = non disponible

Tableau 3. Résultats des évaluations de chaque animal et scores de gravité des différents signes cliniques aux jours 0, 7, 14, 28, 42 et 56 de l'étude																									
		Groupe du produit à l'étude																							
		Signe clinique*																							
		Alopécie						Érythème						Excoriation						Lichénification					
		0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5
Animal	Jour de l'étude																								
1810	0	55	3	4	0	0	0	21	9	10	16	5	1	54	0	5	3	0	0	48	2	7	4	1	0
	7	56	2	4	0	0	0	26	8	10	14	3	1	61	0	0	1	0	0	53	0	7	2	0	0
	14	56	0	5	1	0	0	32	0	9	17	4	0	59	0	3	0	0	0	50	0	6	6	0	0
	28	59	0	3	0	0	0	27	3	19	10	1	2	56	0	6	0	0	0	54	0	6	1	1	0
	42	61	0	1	0	0	0	37	0	14	7	1	3	60	0	1	1	0	0	52	0	4	6	0	0
	56	59	0	2	1	0	0	38	0	8	12	1	3	58	0	3	1	0	0	52	0	5	3	2	0
1903	0	40	2	5	12	3	0	20	7	20	13	2	0	55	1	5	1	0	0	41	3	6	11	1	0
	7	42	2	3	10	5	0	29	13	14	6	0	0	60	1	1	0	0	0	39	6	10	7	0	0
	14	36	6	5	5	10	0	17	9	23	13	0	0	61	0	1	0	0	0	35	9	11	6	1	0
	28	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
	42	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
	56	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
1905	0	35	2	4	13	6	2	26	17	17	2	0	0	46	6	6	4	0	0	41	17	4	0	0	0
	7	34	3	10	8	7	0	35	26	1	0	0	0	59	2	1	0	0	0	49	13	0	0	0	0
	14	34	6	13	4	5	0	35	26	1	0	0	0	61	1	0	0	0	0	54	8	0	0	0	0
	28	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	42	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
	56	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
2009	0	43	7	9	2	1	0	27	10	19	6	0	0	59	2	1	0	0	0	60	0	0	0	0	2
	7	59	0	3	0	0	0	56	3	1	1	1	0	62	0	0	0	0	0	60	0	1	1	0	0
	14	50	11	1	0	0	0	57	4	1	0	0	0	62	0	0	0	0	0	60	0	1	1	0	0
	28	59	2	1	0	0	0	60	0	0	2	0	0	62	0	0	0	0	0	60	0	0	2	0	0
	42	55	2	5	0	0	0	39	12	9	1	0	1	59	1	0	2	0	0	60	0	0	1	1	0
	56	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
2013	0	52	7	1	2	0	0	48	13	0	1	0	0	61	0	0	1	0	0	62	0	0	0	0	0
	7	58	2	0	2	0	0	58	0	4	0	0	0	62	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	14	57	2	3	0	0	0	61	1	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	28	60	0	2	0	0	0	62	0	0	0	0	0	61	1	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	42	60	1	1	0	0	0	60	1	1	0	0	0	62	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	56	59	3	0	0	0	0	61	0	0	0	1	0	62	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0

* 0 = Aucune lésion (peau normale), 1 = lésions légères, 2 ou 3 = lésions modérées, 4 ou 5 = lésions graves, DA = retrait en raison de l'aggravation des signes cliniques de dermatite atopique, ND = non disponible

Tableau 3. Résultats des évaluations de chaque animal et scores de gravité des différents signes cliniques aux jours 0, 7, 14, 28, 42 et 56 de l'étude																									
		Groupe du produit à l'étude																							
		Signe clinique*																							
		Alopécie						Érythème						Excoriation						Lichénification					
		0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5
Animal	Jour de l'étude																								
2020	0	47	9	2	4	0	0	36	11	6	9	0	0	62	0	0	0	0	0	59	3	0	0	0	0
	7	62	0	0	0	0	0	53	4	5	0	0	0	62	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	14	57	5	0	0	0	0	57	3	2	0	0	0	62	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	28	62	0	0	0	0	0	56	6	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	42	62	0	0	0	0	0	57	5	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	56	62	0	0	0	0	0	47	3	12	0	0	0	62	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
2104	0	58	3	0	1	0	0	0	18	33	11	0	0	56	5	0	0	1	0	60	1	1	0	0	0
	7	58	2	1	1	0	0	0	37	20	5	0	0	62	0	0	0	0	0	59	2	1	0	0	0
	14	57	5	0	0	0	0	0	46	15	1	0	0	62	0	0	0	0	0	60	2	0	0	0	0
	28	62	0	0	0	0	0	1	30	30	1	0	0	62	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	42	61	1	0	0	0	0	0	33	25	4	0	0	62	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	56	61	1	0	0	0	0	0	10	31	19	2	0	61	1	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
2107	0	62	0	0	0	0	0	1	43	16	2	0	0	62	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	7	62	0	0	0	0	0	0	30	32	0	0	0	62	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	14	62	0	0	0	0	0	2	32	26	2	0	0	62	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	28	62	0	0	0	0	0	1	34	27		0	0	62	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	42	62	0	0	0	0	0	0	11	39	12	0	0	62	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	56	62	0	0	0	0	0	0	28	31	3	0	0	62	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
2109	0	60	0	2	0	0	0	24	29	4	4	1	0	60	2	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	7	60	1	1	0	0	0	29	28	3	2	0	0	62	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	14	59	2	1	0	0	0	34	22	4	2	0	0	62	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	28	61	1	0	0	0	0	34	22	6	0	0	0	62	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	42	62	0	0	0	0	0	35	19	8	0	0	0	62	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	56	61	1	0	0	0	0	42	13	5	2	0	0	62	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
2203	0	58	2	1	1	0	0	47	7	6	2	0	0	60	0	1	0	1	0	61	1	0	0	0	0
	7	58	3	1	0	0	0	49	9	3	1	0	0	58	0	3	1	0	0	62	0	0	0	0	0
	14	59	3	0	0	0	0	55	7	0	0	0	0	61	0	1	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	28	59	1	2	0	0	0	58	3	1	0	0	0	61	1	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	42	58	3	1	0	0	0	53	9	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
	56	61	1	0	0	0	0	59	3	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0

** 0 = Aucune lésion (peau normale), 1 = lésions légères, 2 ou 3 = lésions modérées, 4 ou 5 = lésions graves, DA = retrait en raison de l'aggravation des signes cliniques de dermatite atopique, ND = non disponible*

Tableau 3. Résultats des évaluations de chaque animal et scores de gravité des différents signes cliniques aux jours 0, 7, 14, 28, 42 et 56 de l'étude																									
		Groupe du produit à l'étude																							
		Signe clinique*																							
		Alopécie						Érythème						Excoriation						Lichénification					
		0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5
Animal	Jour de l'étude																								
2206	0	50	5	4	3	0	0	31	19	8	4	0	0	62	0	0	0	0	0	52	3	1	1	5	0
	7	54	4	2	0	2	0	44	12	2	3	1	0	62	0	0	0	0	0	56	0	4	1	1	0
	14	53	3	5	1	0	0	43	14	3	1	1	0	61	1	0	0	0	0	56	1	2	3	0	0
	28	56	2	2	1	1	0	45	13	4	0	0	0	62	0	0	0	0	0	57	0	4	1	0	0
	42	53	6	2	1	0	0	43	10	6	3	0	0	60	1	1	0	0	0	55	2	1	3	1	0
	56	59	1	1	0	0	1	47	9	3	3	0	0	59	3	0	0	0	0	57	0	3	2	0	0
2304	0	23	26	11	2	0	0	24	19	10	8	1	0	54	6	2	0	0	0	56	1	2	3	0	0
	7	50	11	1	0	0	0	46	9	7	0	0	0	61	1	0	0	0	0	60	0	2	0	0	0
	14	48	14	0	0	0	0	39	13	9	1	0	0	62	0	0	0	0	0	60	2	0	0	0	0
	28	49	13	0	0	0	0	35	25	2	0	0	0	62	0	0	0	0	0	60	0	2	0	0	0
	42	44	13	3	2	0	0	44	8	9	1	0	0	62	0	0	0	0	0	61	1	0	0	0	0
	56	55	7	0	0	0	0	44	14	2	2	0	0	61	1	0	0	0	0	60	2	0	0	0	0
2401	0	18	18	6	10	8	2	15	28	11	1	6	1	58	4	0	0	0	0	27	22	11	2	0	0
	7	23	19	10	8	1	1	24	25	7	4	1	1	56	4	1	0	1	0	36	20	6	0	0	0
	14	22	21	9	7	3	0	20	29	9	4	0	0	60	1	0	0	0	1	40	12	9	0	1	0
	28	32	19	9	2	0	0	41	15	5	0	1	0	61	0	0	1	0	0	43	15	4	0	0	0
	42	36	21	5	0	0	0	44	16	1	1	0	0	61	1	0	0	0	0	50	11	1	0	0	0
	56	36	20	5	1	0	0	49	10	2	1	0	0	61	0	0	1	0	0	52	10	0	0	0	0
2405	0	9	19	21	8	3	2	3	34	14	6	4	1	51	11	0	0	0	0	14	36	11	1	0	0
	7	8	35	13	3	3	0	22	23	10	6	1	0	59	3	0	0	0	0	19	34	8	1	0	0
	14	1	26	12	18	5	0	15	23	9	3	8	4	53	6	3	0	0	0	17	39	5	1	0	0
	28	36	25	1	0	0	0	60	2	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0	47	15	0	0	0	0
	42	40	20	2	0	0	0	60	2	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0	39	22	1	0	0	0
	56	29	27	5	1	0	0	53	8	1	0	0	0	61	0	1	0	0	0	46	15	1	0	0	0
2410	0	29	21	11	1	0	0	37	16	8	1	0	0	58	4	0	0	0	0	39	22	1	0	0	0
	7	32	23	6	1	0	0	54	6	2	0	0	0	61	1	0	0	0	0	50	12	0	0	0	0
	14	50	12	0	0	0	0	59	3	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0	56	6	0	0	0	0
	28	53	9	0	0	0	0	57	5	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0	57	5	0	0	0	0
	42	52	10	0	0	0	0	53	8	0	0	1	0	59	3	0	0	0	0	57	4	1	0	0	0
	56	55	7	0	0	0	0	54	8	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0	60	2	0	0	0	0

** 0 = Aucune lésion (peau normale), 1 = lésions légères, 2 ou 3 = lésions modérées, 4 ou 5 = lésions graves, DA = retrait en raison de l'aggravation des signes cliniques de dermatite atopique, ND = non disponible*

Tableau 3. Résultats des évaluations de chaque animal et scores de gravité des différents signes cliniques aux jours 0, 7, 14, 28, 42 et 56 de l'étude																									
		Groupe du produit à l'étude																							
		Signe clinique*																							
		Alopécie						Érythème						Excoriation						Lichénification					
		0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5
Animal	Jour de l'étude																								
2416	0	19	35	6	1	1	0	37	14	6	4	1	0	50	6	4	1	1	0	24	29	8	1	0	0
	7	23	30	6	2	1	0	34	20	4	2	0	2	58	4	0	0	0	0	34	20	6	1	1	0
	14	34	23	4	1	0	0	42	16	2	1	1	0	59	3	0	0	0	0	43	15	2	1	1	0
	28	30	24	6	2	0	0	40	20	0	1	1	0	58	2	0	2	0	0	39	20	1	1	0	1
	42	34	18	9	1	0	0	36	13	3	8	2	0	55	6	1	0	0	0	44	13	4	1	0	0
	56	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
2420	0	21	31	8	2	0	0	39	22	1	0	0	0	61	1	0	0	0	0	34	26	2	0	0	0
	7	49	13	0	0	0	0	61	1	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0	47	15	0	0	0	0
	14	56	6	0	0	0	0	58	4	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0	47	15	0	0	0	0
	28	56	6	0	0	0	0	60	2	0	0	0	0	61	1	0	0	0	0	49	13	0	0	0	0
	42	47	15	0	0	0	0	60	2	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0	48	14	0	0	0	0
	56	55	6	1	0	0	0	62	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0	56	6	0	0	0	0

* 0 = Aucune lésion (peau normale), 1 = lésions légères, 2 ou 3 = lésions modérées, 4 ou 5 = lésions graves,
 DA = retrait en raison de l'aggravation des signes cliniques de dermatite atopique, ND = non disponible

Type d'étude	Innocuité																							
Étude portant sur	TOUS																							
Objectif de l'étude	Démontrer l'innocuité du produit dans des conditions d'utilisation typiques																							
Administration du produit	2 doses administrées à un mois d'intervalle par voie sous-cutanée																							
Animaux expérimentaux	245 chiens ayant reçu un diagnostic de dermatite atopique recrutés dans 14 établissements vétérinaires. Au total, 162 des chiens ont été traités par le produit à l'étude. Les 83 autres ont eu un placebo (groupe témoin). Les chiens ont reçu la dose indiquée pour les animaux de leur groupe de poids (4 groupes de poids prédéterminés; dose entre 1,0 et 3,3 mg/kg de poids corporel).																							
Description de la provocation	Ne s'applique pas																							
Intervalle observé après la provocation	Tous les chiens ont été observés pendant une période d'au moins 30 minutes après chaque injection. Les propriétaires ont été contactés par téléphone au jour 14. Les chiens ont également été observés par les médecins vétérinaires traitants aux jours 28 et 42 de l'étude.																							
Résultats	<table><tr><th>Fréquence des effets indésirables</th><th>Placebo (groupe témoin)</th><th>Dose de 1,0 à 3,3 mg/kg du produit à l'étude (groupe traité)</th></tr><tr><td>Démangeaisons au site d'injection</td><td>0 (0,0 %)</td><td>1 (0,6 %)</td></tr><tr><td>Inconfort au site d'injection – 1^{re} injection</td><td>4 (4,8 %)</td><td>10 (6,2 %)</td></tr><tr><td>Inconfort au site d'injection – 2^e injection</td><td>6 (7,2 %)</td><td>5 (3,1 %)</td></tr><tr><td>Réaction d'hypersensibilité immédiate</td><td>0 (0,0 %)</td><td>0 (0,0 %)</td></tr><tr><td>Aucun effet indésirable</td><td>73 (88,0 %)</td><td>146 (90,1 %)</td></tr><tr><td>Total</td><td>83 (100 %)</td><td>162 (100 %)</td></tr></table>			Fréquence des effets indésirables	Placebo (groupe témoin)	Dose de 1,0 à 3,3 mg/kg du produit à l'étude (groupe traité)	Démangeaisons au site d'injection	0 (0,0 %)	1 (0,6 %)	Inconfort au site d'injection – 1 ^{re} injection	4 (4,8 %)	10 (6,2 %)	Inconfort au site d'injection – 2 ^e injection	6 (7,2 %)	5 (3,1 %)	Réaction d'hypersensibilité immédiate	0 (0,0 %)	0 (0,0 %)	Aucun effet indésirable	73 (88,0 %)	146 (90,1 %)	Total	83 (100 %)	162 (100 %)
	Fréquence des effets indésirables	Placebo (groupe témoin)	Dose de 1,0 à 3,3 mg/kg du produit à l'étude (groupe traité)																					
	Démangeaisons au site d'injection	0 (0,0 %)	1 (0,6 %)																					
	Inconfort au site d'injection – 1 ^{re} injection	4 (4,8 %)	10 (6,2 %)																					
	Inconfort au site d'injection – 2 ^e injection	6 (7,2 %)	5 (3,1 %)																					
	Réaction d'hypersensibilité immédiate	0 (0,0 %)	0 (0,0 %)																					
	Aucun effet indésirable	73 (88,0 %)	146 (90,1 %)																					
	Total	83 (100 %)	162 (100 %)																					
	Un vaste éventail de médicaments ont été utilisés en concomitance de façon sécuritaire, notamment des antiparasitaires, des antibiotiques, des antifongiques, des corticostéroïdes, des vaccins, des produits d'immunothérapie ciblant des allergènes spécifiques, des antihistaminiques et d'autres antiprurigineux, comme l'occlacitinib et la cyclosporine.																							
	Il n'y a pas eu de différence cliniquement importante entre les groupes en ce qui a trait aux changements pathologiques après chacune des administrations selon le licencié.																							

Tableau de variation des résultats d'hématologie : % d'animaux ayant passé d'un résultat faible/normal au jour 0 à un résultat supérieur à la valeur normale maximale (augmentation) ou d'un résultat normal/élevé au jour 0 à un résultat inférieur à la valeur normale minimale (diminution) aux évaluations suivantes												
Paramètres d'hématologie (intervalle de référence)												
Visite	Globules rouges (5,5-8,5x10 ⁶ cellules/uL)		Hémoglobine (12-18 g/dL)		Hématocrite (37-55 %)		VGM (60-72 fl)		TCMH (19,5-24,5 pg)		CCMH (34-38 g/dL)	
Jour 0	T01	T02	T01	T02	T01	T02	T01	T02	T01	T02	T01	T02
N	82	160	82	160	82	160	82	160	82	160	82	160
Moyenne	6,77	6,69	16,50	16,15	45,39	44,52	67,08	66,64	24,40	24,18	36,40	36,30
Day 28												
N	81	160	81	160	81	160	81	160	81	160	81	160
Moyenne	6,74	6,82	16,56	16,39	45,25	45,16	67,24	66,23	24,59	24,04	36,57	36,30
Augmentation	0,0	1,3	7,4	10,1	0,0	0,6	1,2	0,0	7,4	7,5	3,7	3,1
Diminution	4,9	0,6	1,2	0,6	3,7	1,3	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Day 42												
N	81	159	81	159	81	159	81	159	81	159	81	159
Moyenne	6,75	6,80	16,55	16,30	45,34	44,99	67,27	66,25	24,54	24,01	36,48	36,24
Augmentation	0,0	0,0	4,9	8,9	0,0	0,6	0,0	0,6	12,3	5,7	1,2	2,5
Diminution	3,7	2,5	2,5	1,3	2,5	3,8	0,0	1,3	0,0	0,0	1,2	0,6

Paramètres d'hématologie (intervalle de référence)												
Visite	Plaquettes* (200-500x10 ³ /uL)		Globules blancs (6-17x10 ³ cellules/uL)		Neutrophiles (3-11,5x10 ³ cellules/uL)		Éosinophiles (0.1-1.2x10 ³ cellules/uL)		Lymphocytes (1-4,8x10 ³ cellules/uL)		Monocytes (0,2-1,4x10 ³ cellules/uL)	
Jour 0	T01	T02	T01	T02	T01	T02	T01	T02	T01	T02	T01	T02
N	67	125	82	160	82	160	71	147	82	160	79	158
Moyenne	284	288	9,01	9,16	6,79	6,83	0,33	0,43	1,44	1,36	0,49	0,49
Day 28												
N	60	110	81	160	81	160	67	146	81	160	81	159
Moyenne	303	290	8,75	8,70	6,46	6,18	0,39	0,49	1,44	1,58	0,48	0,47
Augmentation	3,3	0,9	0,0	1,3	4,9	3,1	0,0	4,8	0,0	0,6	1,2	0,6
Diminution	5,0	0,9	3,7	10,1	1,2	4,4	9,0	2,8	18,5	9,4	6,2	12,0
Day 42												
N	53	113	81	159	81	159	68	150	81	159	80	157
Moyenne	306	294	8,98	8,99	6,83	6,55	0,35	0,45	1,34	1,50	0,51	0,50
Augmentation	1,9	2,7	1,2	1,3	8,6	6,3	0,0	2,0	0,0	0,6	1,3	3,8
Diminution	1,9	3,6	7,4	5,7	2,5	1,9	2,9	4,0	18,5	8,9	8,8	9,6

T01, placebo; T02, produit à l'étude; N = nombre de chiens ayant obtenu un résultat à partir d'un échantillon prélevé à la visite prévue. Les valeurs moyennes sont tronquées de façon à ne montrer aucune décimale (*).

Tableau de variation des résultats de biochimie : % d'animaux ayant passé d'un résultat faible/normal au jour 0 à un résultat supérieur à la valeur normale maximale (augmentation) ou d'un résultat normal/élevé au jour 0 à un résultat inférieur à la valeur normale minimale (diminution) aux évaluations suivantes												
Paramètres de biochimie (intervalle de référence)												
	(ALT) Alanine aminotransférase* (10-120 U/L)		(ALP) Phosphatase alcaline* (18-141 U/L)		Albumine (2,7-4,5 g/dL)		Globuline [†] (1,9-3,4 g/dL)		Protéines totales [†] (5,4-7,4 g/dL)		Cholestérol* (130-300 mg/dL)	
Jour 0	T01	T02	T01	T02	T01	T02	T01	T02	T01	T02	T01	T02
Nombre	83	161	83	161	83	161	83	161	83	161	83	161
Moyenne	53	47	183	129	3,68	3,65	2,7	2,8	6,4	6,4	218	220
Day 28												
Nombre	82	161	82	161	82	161	82	161	82	161	82	161
Moyenne	46	44	175	92	3,65	3,61	2,6	2,8	6,3	6,3	228	223
Augmentation	0,0	0,6	0,0	1,3	0,0	0,0	2,4	4,4	1,2	1,9	8,5	3,1
Diminution	0,0	0,0	1,2	0,6	0,0	1,9	0,0	0,0	1,2	0,0	1,2	2,5
Day 42												
Nombre	81	158	81	158	81	158	81	158	81	158	81	158
Moyenne	54	44	187	95	3,69	3,59	2,7	2,8	6,3	6,3	236	219
Augmentation	2,5	1,3	3,7	1,9	0,0	0,0	1,2	3,8	1,2	3,2	11,1	4,5
Diminution	0,0	0,0	2,5	3,8	0,0	1,3	0,0	0,0	1,2	0,6	0,0	1,3

		(BUN) Urée (7-28 mg/dL)		Creatinine (0,6-1,5 mg/dL)		Amylase* (50-1250 U/L)		Lipase* (0-230 U/L)		(CK) Créatine kinase*(50-250 U/L)	
	Jour 0	T01	T02	T01	T02	T01	T02	T01	T02	T01	T02
	Nombre	83	161	83	161	83	161	83	161	83	161
	Moyenne	16,34	17,50	0,82	0,89	645	690	89	91	190	153
	Jour 28										
	Nombre	82	161	82	161	82	161	82	161	82	161
	Moyenne	16,65	17,68	0,85	0,91	672	742	85	109	156	156
	Augmentation	3,7	1,9	2,4	1,9	2,4	4,4	1,2	6,3	8,5	8,1
	Diminution	1,2	1,3	3,7	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	1,3
	Jour 42										
	Nombre	81	158	81	158	81	158	81	158	81	158
	Moyenne	16,64	18,11	0,79	0,91	667	754	100	112	160	174
	Augmentation	3,7	3,8	0,0	2,5	3,7	5,1	3,7	5,1	6,2	12,7
	Diminution	0,0	1,3	4,9	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	T01, placebo; T02, produit à l'étude; N = nombre de chiens ayant obtenu un résultat à partir d'un échantillon prélevé à la visite prévue. Les valeurs moyennes sont tronquées de façon à ne montrer aucune décimale (*) ou une seule décimale (').										
Date d'approbation par l'USDA	Le 13 février 2015										